

五、成功體重管理

- 如何維持健康體位



五、成功體重管理 - 如何維持健康體位

- 5-1 體重管理方法
- 5-2 體重管理流程
- 5-3 健康體重管理
- 5-4 成功體重管理



5-1 體重管理方法

- 5-1-1 體重管理原則
- 5-1-2 體重管理成員
- 5-1-3 體重管理方法




5-1-1 體重管理原則

- 評估體重及身體狀況
- 評估飲食及運動狀況
- 建立均衡飲食及規律運動
- 修正不良生活型態
- 減少肥胖相關合併症
- 保持健康體位



5-1-2 體重管理成員

- 基層保健人員
- 護理從業人員
- 衛教人員
- 病友團體
- 臨床心理師
- 專科醫師
- 肥胖專家
- 營養師
- 體適能諮商師
- 藥劑師



5-1-3 體重管理方法

- 飲食介入
- 促進運動
- 生活行為改變
- 心理建設
- 藥物治療
- 手術治療

| BMI | 治療方式 | | |
|-------|--------------|----|-----|
| | 飲食運動 生活型態 | 藥物 | 手術 |
| 24-27 | V | | |
| 27-30 | V | V | |
| 30-35 | V | V | |
| 35-40 | V | V | V * |

* 合併慢性相關疾病，如：糖尿病

5-2 體重管理流程

- 5-2-1 體重管理策略-成人
- 5-2-2 世界衛生組織（WHO）體重管理流程
- 5-2-3 衛生署體重管理流程-成人
- 5-2-4 衛生署體重管理流程-兒童與青少年



5-2-1 體重管理策略-成人

全面健康危險因子

| BMI | |
|--------|-----------|
| BMI | 18.5-24.9 |
| Taiwan | 18.5-23.9 |
| BMI | 25-29.9 |
| Taiwan | 24-26.9 |
| BMI | 30-34.9 |
| Taiwan | 27-29.9 |
| BMI | 35-39.9 |
| Taiwan | 30-34.9 |
| BMI | ≥40 |
| Taiwan | ≥35 |

危險因子有無?



體重管理策略

健康飲食及預防體重增加
腰圍增加：著手進行體重管理
肥胖家族史：預防體重增加大於3公斤
吸菸：戒除、提供飲食指導
脂質過高：飲食建議
高血壓：飲食、運動、體重維持
血糖耐受性：飲食、運動、體重維持

維持體重、健康飲食、運動

設定飲食、運動及行為目標：首先啟動危險管理。若3個月危險因子未持續減少，則需進行減重。以24週減少5-10公斤為目標。若24週後未達體重控制目標則以藥物進行體重管理。


以減少5-10%體重為目標。

若經由12週的飲食、運動及生活型態修飾無法減少危險因子數時，考慮極低熱量飲食及藥物治療。


使用所有療法包含藥物，以達到減少10%體重。

若常見慣例所使用之治療方法無法降低體重，則轉介至專科醫師進行個別管理。目標為減輕20-30%的體重

5-2-2 世界衛生組織體重管理方法



5-2-3 衛生署體重管理流程-成人



行政院衛生署


Department Of Health, Taiwan, R. O. C.



5-2-4 衛生署體重管理流程-兒童與青少年




行政院衛生署
Department Of Health, Taiwan, R. O. C.



5-3 健康體重管理

- 5-3-1 常見錯誤體重管理
- 5-3-2 健康體重管理
- 5-3-3 均衡飲食
- 5-3-4 規律運動
- 5-3-5 生活型態修正



5-3-1 常見錯誤體重管理

| 減重方式 | 成效表徵 | 實際影響 |
|-------------------------|-------------|--|
| 飲食療法 -高蛋白質飲食法 | 只吃肉不吃澱粉 | 1.心臟病、高血壓患者不適合 2.增加肝臟、腎臟代謝負擔 3.造成骨質疏鬆、抽筋 |
| -瘦身湯 | 迅速減輕體重 | 1.雖無化學成分，但快速減少肌肉易引發身體病變 2.長期使用影響營養均衡 |
| -斷食 | 中斷飲食，消耗體內熱量 | 1.虛弱 2.易引發身體病變 3.長期斷食易引發厭食症 |
| 其他方法 -三溫暖蒸氣浴 | 使體內暫時失去水份 | 1.補充水份即體重上升 |
| -針灸指壓 | 抑制食慾 | 1.不能持久 |

5-3-1-1 常見錯誤體重管理

| 減重方式 | 成效表徵 | 實際影響 |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 不當藥物 -利尿劑 | 脫水，體重暫時下降 | <ol style="list-style-type: none"> 1.非減少脂肪 2.副作用：嘔吐，暈眩，虛弱，血壓下降，引發糖尿病，破壞腎功能 3.停止服用體重即回升 |
| -膨脹劑 | 不能被人體酵素消化吸收的膳食纖維，吸水性高，使胃部有飽脹感進而減少進食 | <ol style="list-style-type: none"> 1.影響礦物質：鈣、鐵、鋅等的吸收 |
| 甲狀腺/荷爾蒙 | 刺激甲狀腺功能，增加代謝速率 | 影響自體內分泌或荷爾蒙代謝，進而造成病變 |
| 手術 -抽脂 | 割除或吸出腹部或臀部過多的脂肪 | <ol style="list-style-type: none"> 1.治標不治本，會再發胖 |



5-3-2 健康體重管理

- 應維持均衡的營養，攝取充足的蛋白質、維生素及礦物質
- 配合恆久適當的運動
- 減重不宜太快，一週以0.5~1公斤為原則（每天減少500大卡熱量攝取或增加500大卡熱量消耗）



5-3-3 均衡飲食

- 控制食物的質與量及烹調方式
- 忌食甜膩、油炸、脂肪高之堅果類(如花生、腰果類)、汽水可樂等，高脂肪、高熱量及熱量濃縮型食物，以白開水取代飲料
- 多用蒸、煮、烤、涼拌等低油方式
- 避免無謂應酬
- 吃到不餓，不要吃到飽(或吃到七、八分飽)
- 營養素及熱量平均分配，不偏廢任何一餐，定時定量，勿暴飲暴食，點心應列入飲食計畫，不宜吃宵夜，亦可準備一些低熱量點心作為解饞之用
- 選用熱量低，體積大，膳食纖維豐富的食物
- 細嚼慢嚥，延長進食時間，以小盤盛裝食物，滿足視覺
- 不要吃太鹹太辣，口味重易增加食慾，並可控制血壓，減輕心臟負荷
- 改變用餐順序，先喝湯，再吃蔬菜，再慢慢吃肉類和飯
- 飢餓時，先吃些全麥高纖的小點心，再喝一杯水，亦可準備一些低熱量點心作為解饞之用
- 多吃新鮮的蔬菜、水果儘量選擇糖分低的種類
- 不應限制水份攝取，反而應堅持每日喝足量的水



5-3-4 規律運動

- 建立日常化、生活化及居家化的運動方式
- 依身體狀況、年齡選擇適合的運動及合理的運動計畫，必要時得請教醫師或體適能專業人員
- 循序漸進：每週的運動頻率至少五次以上，每天的運動時間由15分鐘，慢慢增加至60分鐘
- 運動強度應視個人體能狀況而定
 - (約為最大心跳數的60-90% (最大心跳數 = 220-年齡))
- 在生活中增加運動的機會



5-3-5 生活型態修正

- 改變生活習慣、起居習慣、飲食習慣等
- 多走路，少坐車，儘量走樓梯。切記，電梯是肥胖的好朋友！
- 不鼓勵過度的看電視（看電視時消耗的熱量比休息時還低）
- 飯後立刻刷牙
- 一定在餐桌上用餐，專心進食，進食時不可看書或看電視
- 培養休閒習慣與及宣洩情緒管道。不要因為失戀、無聊、心情不好而暴飲暴食
- 想要吃垃圾食物時，請再想想您的體重與健康
- 定時（最好天天秤）測重記錄，適時給予自己獎懲



5-4 成功體重管理

- 5-4-1 體重管理目標
- 5-4-2 體重管理好處
- 5-4-3 體重管理禁忌
- 5-4-4 成功體重管理定義



5-4-1 體重管理目標

- 長期維持體重
- 改善危險因子
- 促進體重減輕
- 長期預防體重增加
- 鼓勵積極生活型態
- 增進生活品質



5-4-2 體重管理好處

- 減少10%體重的效果

減少10%體重的效果



死亡率

↓ 20%全部

↓ 30%糖尿病相關

↓ 40%肥胖引起相關癌症



血壓

↓ 10 mmHg收縮壓

↓ 20 mmHg舒張壓



血脂

↓ 10%總膽固醇

↓ 15%低密度膽固醇

↓ 30%三酸甘油脂

↑ 8%高密度膽固醇



糖尿病

↓空腹血糖和改善糖尿病的控制



5-4-3-1 體重管理禁忌

• 飲食

- 1.每餐慢吃細嚼：這是滿足食慾和減少食量的最佳方法。
- 2.糖分和油量夠了就好：減少每日糖分(飯麵)和油脂的攝食量，是減重的必要方法。
- 3.不喝炒菜湯：此湯含油量高，易吸收，非常容易讓人長胖。
- 4.不吃宵夜：睡前進食，熱量最容易轉變成脂肪堆積在腹部。
- 5.不吃剩菜剩飯：為了不浪費，每次都把碗裡和盤裡的剩飯剩菜，送進肚裡，不長胖也難。

5-4-3-1 體重管理禁忌

• 飲食(續)

- 6.每種食物都有缺點，多吃不但無益，反而有害：體重愈重，食量愈大，各種食物的缺點，表現的機會愈大，身體受害的機會愈多。
- 7.飯局可參加，但要慎選盤中物進食：少脂肪和少澱粉的食物，還是可以吃。
- 8.限鹽：鹽是最容易吸水的物質，口味重的人，一定要喝很多水，四杯水就有一公斤重。其實，喝水是讓人增重，不是讓人長胖。故除去過多的水分可減重。
- 9.限酒：酒精是次高熱量的食物，其熱量僅次於脂肪。

5-4-3-1 體重管理禁忌

- 運動

1. 餓的時候，就是身體燃燒脂肪的時候：這時候運動半小時至一小時，燃燒脂肪的效果最佳，運動後要注意補充水分。
2. 被動運動：只使用被動運動(如按摩或SPA)，而沒有主動運動(如跑步或快走)的規劃



5-4-3-1 體重管理禁忌

• 生活型態

1. 切忌快速減重：快速減重成功後，很難維持減重的效果，理由是快速減重方法，不屬於自然生活習慣。
2. 切忌貪睡：每天睡七小時足矣，睡眠時代謝率最低，能量消耗最少，膽固醇和脂肪的合成量大增，貪睡但是少吃也會長胖的主要成因。
3. 休閒時間，少吃東西：休閒時代謝率低，熱量消耗少，食物熱量應酌予減少。
4. 意志力較弱的胖子：應善用他人之力，達到減重的效果，例如找個可靠的減重顧問，協助維持一生理想體重。
5. 控制體重，是健康的生活方式：減重成功而能維持的人，才算成功。

5-4-4 成功體重管理定義

- 減輕體重
 - 成功 > 5%
 - 很棒 > 10%
 - 優秀 > 20%
- 維持體重
 - 兩年後追蹤，體重復胖小於3公斤
 - 維持腰圍減少4公分
- 合併症改善
 - 減少肥胖相關合併症指標
 - 收縮壓
 - 舒張壓
 - 膽固醇
 - 高密度脂蛋白膽固醇
 - 低密度/高密度脂蛋白膽固醇
 - 三酸甘油脂
 - 空腹血糖和糖化血紅蛋白

健康100 臺灣動起來
健康減重101，幸福臺北一等一

